

報道機関各位

2011年5月2日



基礎生物学研究所
金沢大学
科学技術振興機構（JST）

シダゲノムの解読

～陸上植物遺伝子の予想外の多様性を発見：遺伝子資源として有用～

大学共同利用機関である基礎生物学研究所の長谷部光泰 教授、金沢大学学際科学実験センター遺伝子研究施設の西山智明 助教らは、国内5大学および国外9ヵ国による国際共同研究チームと共同で、シダ植物^{注1)}の一種であるイヌカタヒバ^{注2)}（図1）のゲノム解読に成功しました。

従来、陸上植物の中で最も複雑な形を持った被子植物^{注3)}と最も単純な形を持ったコケ植物^{注4)}のゲノムは解読されていました。しかし、両者の中間に位置するシダ植物はゲノムの大きさが大きく、ゲノム解読が難しかったことから、どのような遺伝子のどのような進化によって陸上植物が進化してきたのかは謎でした。

今回、ゲノムの大きさが極めて小さいイヌカタヒバを用いることで、シダ植物のゲノム解読に初めて成功し、シダ植物とコケ植物、被子植物のゲノムを比較解析した結果、陸上植物が共通に持つ遺伝子が明らかになりました。また、花の咲く植物（被子植物）と花の咲かない植物（シダ植物）との間で、遺伝子の発現を制御する遺伝子（転写因子^{注5)}）の数が増えており、これが単純な形を持った植物から複雑な形を持った植物への進化を引き起こした可能性が高いことも分かりました。これまで、植物は動物と比べると互いに形が似ていることから、動物よりも遺伝子の進化の程度がずっと少ないだろうと思われてきましたが、今回の研究結果より、陸上植物のゲノムは動物よりも大きく変化していることが明らかになりました。さらに、病気や害虫に食べられないようにしたり花粉を運ぶ昆虫を引き寄せたりする働きを持つ二次代謝産物^{注6)}や植物の生育に必要な植物ホルモンの合成酵素遺伝子などは、被子植物・シダ植物・コケ植物でそれぞれ独自に数を増やしたり減らしたりして多様性を産み出していることも分かりました。今後、シダ植物やコケ植物特有の“有用な性質を産み出す遺伝子”を見つけ出し、作物などの改良に利用することによって、製薬やバイオマス生産を含む農林業への応用が進むものと期待されます。

なお本研究の一部は、科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 ERATO型研究「長谷部分化全能性進化プロジェクト」（研究総括：長谷部光泰）の一環として行われました。

本研究成果は、2011年5月5日（米国東部時間）に米国科学雑誌「Science」のオンライン速報版で公開され、同誌の2011年5月6日号に掲載されます。

[研究の背景と経緯]

生物は、祖先が持っていたゲノムが変化することによって進化します。近年、いろいろな動物のゲノム解析から、人間でも動物でも基本的な体作りには同じような遺伝子が用いられていることが分かってきました。どのような遺伝子が同じで、どのような遺伝子が異なっているかを知ることによって、ヒトの疾患モデルとして動物を使って実験することが可能になりました。また、ヒトだけにあり、ヒトを特徴づけている遺伝子が何かも分かってきました。

一方、作物をはじめとして、地球環境に欠くことのできない陸上植物については、作物を含む被子植物以外、ほとんどゲノム解読がされてこなかったため、陸上植物全体に共通な遺伝子、陸上植物の代表的なグループに特徴的な遺伝子が何なのかが分かりませんでした。また、被子植物以外の植物の遺伝子を用いて作物を品種改良することが困難でした。

本研究チームは、2007年に被子植物と最も遠縁のコケ植物ヒメツリガネゴケゲノムを解読し、植物の陸上化に重要だった遺伝子候補を提唱しました。しかし、被子植物とコケ植物の間に位置するシダ植物のゲノム情報がなかったため、陸上植物全体に共通な遺伝子、各グループに固有な遺伝子を特定することができませんでした。しかし、シダ植物はゲノムの大きさが大きく（被子植物やコケ植物の100倍以上）、ゲノム解読が困難で研究が難航していました。

[研究の内容]

今回、シダ植物イヌカタヒバのゲノムの大きさが極めて小さい（1億600万塩基対）ことが分かり、日本・2名（長谷部教授、西山助教）、米国・4名、オーストラリア・1名の運営委員会を組織し、日本の5大学（北海道大学、名古屋大学、総合研究大学院大学、金沢大学、大阪大学）を含む、10ヵ国の共同研究として、世界で初めてシダ植物のゲノム解読を行い、これに成功しました。日本グループは主に情報解析（特に幹細胞化、発生に関わる遺伝子）を担当しました。

ゲノム解読から、イヌカタヒバはこれまでゲノムが解読された被子植物（約26,000遺伝子）やコケ植物（約28,000遺伝子）よりやや少ない約22,000の遺伝子を持っていること、また遺伝子間の長さが短いためにゲノムの大きさが小さいことが明らかになりました。

次に、被子植物・シダ植物・コケ植物に共通に存在する「発生に関わる遺伝子のリスト」を作りました。その中には細胞分裂、細胞の形、遺伝様式に関わる遺伝子があり、これらの機能は植物全体に共通であるらしいということが分かりました。

一方で、陸上植物の転写因子の数は、種類によって大きく異なることが分かりました（図2）。生物の発生に関わる遺伝子は、それぞれ会社のように役割分担しています。転写制御因子は部長や課長にあたるような統括遺伝子で、多くの部下遺伝子に命令を出して体作りをしています。動物の場合には、異なった種類（例えば人間とハエ）でも転写因子の種類や数はあまり変わらず、部下遺伝子が変わることによって多様な形を作っています。しかし陸上植物は、転写因子の数が大きく異なっていました。例えば、被子植物の花作りなどで働く課長にあたる転写因子

「MADS-box 遺伝子」は、被子植物のゲノムでは約40個ありますが、イヌカタヒバは3個、ヒメツリガネゴケは6個しかありません。また、被子植物の茎や葉を作るのに必要なオーキシンという植物ホルモンを働かせる転写制御因子「AUX/IAA 遺伝子」は、被子植物のゲノムでは約30個あるのに対して、イヌカタヒバやヒメツリガネゴケでは3個しかありません。このように、転写因子は被子植物の祖先の段階で数を増やすことによって、陸上植物は複雑な体を進化させてきたらしいことが分かりました。

さらに、被子植物・シダ植物・コケ植物で、それぞれに特有の遺伝子があることも分かりました（図3）。エチレンは、果実成熟や植物の老化促進、病傷害応答など、サイトカイニンは植物の老化抑制や細胞分裂促進などに関わるホルモンですが、イヌカタヒバやヒメツリガネゴケはこれらのホルモンを異なる合成遺伝子を用いて作っていました。加えて病気や害虫に食べられないようにしたり花粉を運ぶ昆虫を引き寄せたりする働きを持つ二次代謝産物を作る遺伝子は、どのグループでも独自にその遺伝子の数を増やし、それぞれの生育環境に適応していることも分かりました。

[今後の展開]

シダ植物・コケ植物は作物などの被子植物の持っていないたくさんの有用な性質を持っています。例えば、乾燥耐性能力や再生能力、耐病虫害性は被子植物よりもずっと優れています。今回の研究で遺伝子のリストができたことから、今後、これらの働きを司る遺伝子を解析することが容易になります。将来的には、作物に有用な性質を付与し品種改良することに役立つものと期待されます。



図1 シダ植物小葉類イヌカタヒバの自生写真（沖縄県西表島）

統括遺伝子の数を増やすことによる進化




図2 今回の研究から分かった遺伝子の進化と形の進化の関係

陸上植物は統括遺伝子（転写制御遺伝子）の数が変化することによって、単純な形を持った植物から複雑な形を持った植物が進化した。

シダ、コケ、被子植物に特有な遺伝子の発見




図3 シダ、コケ、被子植物に特有な遺伝子

シダ植物とこれまで調べられた他の植物のゲノム比較解析から、被子植物、シダ植物、コケ植物に特有な遺伝子が明らかになった。

【用語解説】

注1) シダ植物

小葉類とシダ類を含む。イヌカタヒバは小葉類で、ワラビ、ゼンマイなどはシダ類。小葉類は石炭紀に30メートルほどの樹林を形成し、石炭の多くは小葉類の遺骸からできあがったものである。

注2) イヌカタヒバ (犬・片・檜葉)

国内では元来沖縄県を中心に分布するが、全国に移出している。イヌカタヒバに近縁(同じ属)のイワヒバは乾燥すると枯れたように葉が巻かれるが、水分があると元に戻るため「復活草」と呼ばれる。イヌカタヒバも同じような性質がある。

注3) 被子植物

花の咲く植物の総称で、約2億年前に進化した。ほとんどの作物は被子植物である。

注4) コケ植物

被子植物に比べて小さく単純な構造の体を持つ。花・種子を作らず、胞子で繁殖する。ヒメツリガネゴケや寺などで良く用いられるスギゴケの含まれる^{せんるい}蘚類、ゼニゴケなどの^{たいるい}苔類を含む。

注5) 転写因子

遺伝子の発現をオン・オフしたり、発現量を増減したりして、遺伝子の発現を制御する遺伝子。1つの転写因子で複数の遺伝子発現を制御する場合も多い。

注6) 二次代謝産物

生物の代謝によって作られるが、生物の生存などに直接的に関与しない有機化合物。植物の二次代謝産物には染料・芳香剤・殺虫殺菌剤など、人類の生活に役立つものが多数ある。

【発表雑誌】

米国科学雑誌「Science (サイエンス)」2011年5月6日号掲載

(米国東部時間5月5日に電子版で速報として公開されます)

論文タイトル: "The compact *Selaginella* genome identifies changes in gene content associated with the evolution of vascular plants"

「コンパクトなイヌカタヒバゲノムから明らかになった、維管束植物進化に関係した遺伝子の変化」

【研究グループ】

イヌカタヒバ *Selaginella moellendorffii* ゲノム国際コンソーシアム (日、米、独、英など10カ国の共同研究)

主たるコンソーシアムメンバー

◎日本

西山智明 Tomoaki Nishiyama 金沢大学 学際科学実験センター

長谷部光泰 Mitsuyasu Hasebe 基礎生物学研究所／総合研究大学院大学

◎米国

Jo Ann Banks Purdue 大学

Michael Gribskov Purdue 大学

Claude dePamphilis Pennsylvania 州立大学

Igor V. Grigoriev Joint Genome Institute

◎オーストラリア

John L. Bowman Monash 大学

[報道解禁日時]

日本時間 2011年5月6日(金) 午前3時

[研究サポート]

本研究の一部は、文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「比較ゲノム」、文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「複合適応形質進化」、独立行政法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 E R A T O型研究「長谷部分化全能性進化プロジェクト」の一環として行われました。

[本件に関するお問い合わせ先]

<研究に関すること>

長谷部 光泰 (ハセベ ミツヤス)

基礎生物学研究所 生物進化研究部門 教授

〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38

Tel: 0564-55-7546 Fax: 0564-55-7548

E-mail: mhasebe@nibb.ac.jp

ホームページ <http://www.nibb.ac.jp/evodevo>

西山 智明 (ニシヤマ トモアキ)

金沢大学 学際科学実験センター遺伝子研究施設 助教

〒920-8640 金沢市宝町 13 番 1 号

Tel : 076-265-2776 Fax : 076-234-4536

E-mail : tomoakin@kenroku.kanazawa-u.ac.jp

< J S Tの事業に関すること >

金子 博之 (カネコ ヒロユキ)

科学技術振興機構 イノベーション推進本部 研究プロジェクト推進部

〒102-0075 東京都千代田区三番町5 三番町ビル

Tel: 03-3512-3528 Fax: 03-3222-2068

E-mail: hkaneko@jst. go. jp

< 報道担当 >

倉田 智子 (クラタ トモコ)

基礎生物学研究所 広報国際連携室

〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38

Tel: 0564-55-7628 携帯: 090-3951-9619 (いつでもお気軽にお問い合わせ下さい)

Fax: 0564-55-7597

E-mail: press@nibb. ac. jp

福田 外志恵 (フクダ トシエ)

金沢大学 広報戦略室

〒920-1192 金沢市角間町

Tel : 076-264-5024 Fax : 076-234-4015

E-mail : koho@adm. kanazawa-u. ac. jp

科学技術振興機構 広報ポータル部

〒102-8666 東京都千代田区四番町5 番地3

Tel: 03-5214-8404 Fax: 03-5214-8432

E-mail : jstkoho@jst. go. jp