

# ***Giochi e dilemmi***

***Parte I – Giochi ad informazione completa***

Alberto Abbondandolo

Elena Visibelli    Pietro Battiston

Università di Pisa

Stage di orientamento in Matematica 2008

---

---

***Cosa è un gioco ad informazione completa?***



# *Cosa è un gioco ad informazione completa?*

- Due giocatori: **A**lice e **B**runo.

## *Cosa è un gioco ad informazione completa?*

- Due giocatori: **A**lice e **B**runo.
- Una posizione iniziale ed un numero finito di posizioni successive.

## *Cosa è un gioco ad informazione completa?*

- Due giocatori: **A**lice e **B**runo.
  - Una posizione iniziale ed un numero finito di posizioni successive.
  - Regole che stabiliscono quali posizioni siano raggiungibili da ciascuna posizione.
- 
-

## *Cosa è un gioco ad informazione completa?*

- Due giocatori: **A**lice e **B**runo.
  - Una posizione iniziale ed un numero finito di posizioni successive.
  - Regole che stabiliscono quali posizioni siano raggiungibili da ciascuna posizione.
  - Alice e Bruno muovono alternandosi.
- 
-

## *Cosa è un gioco ad informazione completa?*

- Due giocatori: **A**lice e **B**runo.
  - Una posizione iniziale ed un numero finito di posizioni successive.
  - Regole che stabiliscono quali posizioni siano raggiungibili da ciascuna posizione.
  - Alice e Bruno muovono alternandosi.
  - Alice e Bruno conoscono l'intera situazione.
- 
-

## *Cosa è un gioco ad informazione completa?*

- Due giocatori: **A**lice e **B**runo.
  - Una posizione iniziale ed un numero finito di posizioni successive.
  - Regole che stabiliscono quali posizioni siano raggiungibili da ciascuna posizione.
  - Alice e Bruno muovono alternandosi.
  - Alice e Bruno conoscono l'intera situazione.
  - Non ci sono mosse casuali.
- 
-





## *Cosa è un gioco ad informazione completa?*

- Due giocatori: **A**lice e **B**runo.
  - Una posizione iniziale ed un numero finito di posizioni successive.
  - Regole che stabiliscono quali posizioni siano raggiungibili da ciascuna posizione.
  - Alice e Bruno muovono alternandosi.
  - Alice e Bruno conoscono l'intera situazione.
  - Non ci sono mosse casuali.
  - Il giocatore che non può più muovere perde.
- 
-


## *Cosa è un gioco ad informazione completa?*

- Due giocatori: **A**lice e **B**runo.
  - Una posizione iniziale ed un numero finito di posizioni successive.
  - Regole che stabiliscono quali posizioni siano raggiungibili da ciascuna posizione.
  - Alice e Bruno muovono alternandosi.
  - Alice e Bruno conoscono l'intera situazione.
  - Non ci sono mosse casuali.
  - Il giocatore che non può più muovere perde.
  - Il gioco termina in un numero finito di mosse.
- 
-


# *Le posizioni del Chomp 2x3*



# Costruiamo il grafo del Chomp 2x3



# *Ecco il grafo del Chomp 2x3*



# *Posizioni vincenti e perdenti*

- Sono **V**incenti quelle posizioni partendo dalle quali è sempre possibile vincere.



# *Posizioni vincenti e perdenti*

- Sono **V**incenti quelle posizioni partendo dalle quali è sempre possibile vincere.
- Sono **P**erdenti le altre posizioni.



# *Posizioni vincenti e perdenti*

- Sono **V**incenti quelle posizioni partendo dalle quali è sempre possibile vincere.
  - Sono **P**erdenti le altre posizioni.
  - Se siamo in una posizione vincente, abbiamo almeno una mossa che porta in una posizione perdente.
- 
-

# *Posizioni vincenti e perdenti*

- Sono **V**incenti quelle posizioni partendo dalle quali e' sempre possibile vincere.
  - Sono **P**erdenti le altre posizioni.
  - Se siamo in una posizione vincente, abbiamo almeno una mossa che porta in una posizione perdente.
  - Se siamo in una posizione perdente, ogni mossa ci porta in posizioni vincenti.
- 
-

# *Come classificare le posizioni*

1. Marcare ogni posizione terminale come P.



# *Come classificare le posizioni*

1. Marcare ogni posizione terminale come P.
2. Marcare come V ogni posizione da cui si può raggiungere una posizione P con una sola mossa.


# *Come classificare le posizioni*

1. Marcare ogni posizione terminale come P.
2. Marcare come V ogni posizione da cui si può raggiungere una posizione P con una sola mossa.
3. Trovare le posizioni da cui si possono raggiungere solo posizioni V e marcarle come P.


# *Come classificare le posizioni*

1. Marcare ogni posizione terminale come P.
  2. Marcare come V ogni posizione da cui si può raggiungere una posizione P con una sola mossa.
  3. Trovare le posizioni da cui si possono raggiungere solo posizioni V e marcarle come P.
  4. Se nel passo 3 non abbiamo aggiunto nessuna nuova P, STOP. Altrimenti ripartire dal passo 2.
- 
-


# *Analisi del Chomp 2x3*




# *Marchiamo le posizioni terminali come P*




*Marchiamo come V le posizioni da cui si può andare in una posizione P*




*Marchiamo come P le posizioni da cui si può andare solo in una posizione V*




*Marchiamo come V le posizioni da cui si può andare in una posizione P*



*Marchiamo come P le posizioni da cui si può andare solo in una posizione V*



*Marchiamo come V le posizioni da cui si può andare in una posizione P*



# *Analisi del Chomp $2 \times N$*

- Ogni posizione consiste di  $h$  quadretti sulla riga bassa, con  $1 \leq h \leq N$ , e di  $k$  quadretti sulla riga alta, con  $0 \leq k \leq h$ . Indichiamo questa posizione come  $(h, k)$ .

# *Analisi del Chomp $2 \times N$*

- Ogni posizione consiste di  $h$  quadretti sulla riga bassa, con  $1 \leq h \leq N$ , e di  $k$  quadretti sulla riga alta, con  $0 \leq k \leq h$ . Indichiamo questa posizione come  $(h, k)$ .
  - Sia  $X$  l'insieme di tutte le soluzioni e sia  $Y$  il sottoinsieme delle posizioni  $(h, h-1)$  con  $1 \leq h \leq N$ .
- 
-

# *Analisi del Chomp $2 \times N$*

- Ogni posizione consiste di  $h$  quadretti sulla riga bassa, con  $1 \leq h \leq N$ , e di  $k$  quadretti sulla riga alta, con  $0 \leq k \leq h$ . Indichiamo questa posizione come  $(h, k)$ .
  - Sia  $X$  l'insieme di tutte le soluzioni e sia  $Y$  il sottoinsieme delle posizioni  $(h, h-1)$  con  $1 \leq h \leq N$ .
  - La posizione terminale è in  $Y$ , da ogni posizione non in  $Y$  si può raggiungere  $Y$ , da  $Y$  si può solo uscire.
- 
-

# *Analisi del Chomp $2 \times N$*

- Deduciamo che le posizioni  $Y$  sono tutte perdenti, le altre vincenti. In particolare, la posizione iniziale è vincente.

# *Argomento della mossa rubata*

- In un qualunque Chomp  $M \times N$  Alice ha la possibilità di vincere.

# *Argomento della mossa rubata*

- In un qualunque Chomp  $M \times N$  Alice ha la possibilità di vincere.
- Se eliminare il quadratino in alto a destra non porta in una posizione  $P$ , vuol dire che se Alice parte con questa mossa Bruno ha una mossa che porta in una posizione  $P$ .

# *Argomento della mossa rubata*



- In un qualunque Chomp  $M \times N$  Alice ha la possibilità di vincere.
  - Se eliminare il quadratino in alto a destra non porta in una posizione  $P$ , vuol dire che se Alice parte con questa mossa Bruno ha una mossa che porta in una posizione  $P$ .
  - Ma allora Alice poteva fare subito la mossa di Bruno.
- 
-

# *Argomento della mossa rubata*

- In un qualunque Chomp  $M \times N$  Alice ha la possibilità di vincere.
  - Se eliminare il quadratino in alto a destra non porta in una posizione  $P$ , vuol dire che se Alice parte con questa mossa Bruno ha una mossa che porta in una posizione  $P$ .
  - Ma allora Alice poteva fare subito la mossa di Bruno.
  - Questo argomento non ci fornisce una strategia vincente!
- 
-


# *Il gioco del Nim*

- Si parte con un certo numero di pietre forate infilate in diversi pioli.




# *Il gioco del Nim*

- Si parte con un certo numero di pietre forate infilate in diversi pioli.
- Alice e Bruno a turno tolgono quante pietre vogliono – ma almeno una – da un solo piolo.



# *Il gioco del Nim*



- Si parte con un certo numero di pietre forate infilate in diversi pioli.
- Alice e Bruno a turno tolgono quante pietre vogliono – ma almeno una – da un solo piolo.
- Vince chi toglie l'ultima pietra.

# *Le posizioni perdenti nel Nim*

- Si scrivono i numeri delle pietre in ciascun piolo in base 2.

# *Le posizioni perdenti nel Nim*

- Si scrivono i numeri delle pietre in ciascun piolo in base 2.
- $A = 6 = 110$
- $B = 15 = 1111$
- $C = 9 = 1001$

# *Le posizioni perdenti nel Nim*

- Si scrivono i numeri delle pietre in ciascun piolo in base 2.
  - Si incolonnano questi numeri in base 2: se in ciascuna colonna gli **1** sono in numero pari, la posizione è perdente.
- $A = 6 = 110$
  - $B = 15 = 1111$
  - $C = 9 = 1001$
- 
-

# *Le posizioni perdenti nel Nim*

- Si scrivono i numeri delle pietre in ciascun piolo in base 2.
- Si incolonnano questi numeri in base 2: se in ciascuna colonna gli **1** sono in numero pari, la posizione è perdente.
- $A = 6 = 110$
- $B = 15 = 1111$
- $C = 9 = 1001$
- La posizione sopra è perdente.

# *Le posizioni perdenti nel Nim*

- Si scrivono i numeri delle pietre in ciascun piolo in base 2.
  - Si incolonnano questi numeri in base 2: se in ciascuna colonna gli **1** sono in numero pari, la posizione è perdente.
  - $A = 6 = 110$   
 $B = 15 = 1111$   
 $C = 9 = 1001$
  - La posizione sopra è perdente.
  - Se nel piolo C il numero di pietre fosse  $C = 11 = 1011$  la posizione sarebbe vincente.
- 
-

*Perché sono queste le posizioni P?*



# *Perché sono queste le posizioni $P$ ?*

- Indichiamo con  $Y$  l'insieme di queste posizioni. La posizione terminale  $(0,0,0)$  sta in  $Y$ .

# *Perché sono queste le posizioni $P$ ?*

- Indichiamo con  $Y$  l'insieme di queste posizioni. La posizione terminale  $(0,0,0)$  sta in  $Y$ .
  - Da una posizione non in  $Y$  possiamo muovere in  $Y$ : guardiamo alla prima colonna a sinistra con una discrepanza e scelto un numero con un **1** in tale colonna, cambiamo quelle sue cifre necessarie a ristabilire la parità.
- 
-

## *Perché sono queste le posizioni $P$ ?*

- Indichiamo con  $Y$  l'insieme di queste posizioni. La posizione terminale  $(0,0,0)$  sta in  $Y$ .
  - Da una posizione non in  $Y$  possiamo muovere in  $Y$ : guardiamo alla prima colonna a sinistra con una discrepanza e scelto un numero con un **1** in tale colonna, cambiamo quelle sue cifre necessarie a ristabilire la parità.
  - Da una posizione in  $Y$  non possiamo rimanere in  $Y$ : dovendo modificare il numero di pietre in un piolo, cambieremo almeno una cifra di esattamente uno dei numeri in base 2: nella relativa colonna gli **1** non saranno più in numero pari.
- 
-

*E adesso a voi!*

1) Analizzare il Chomp  $N \times N$ .

# *E adesso a voi!*

- 1) Analizzare il Chomp  $N \times N$ .
- 2) Analizzare il “Gioco del 31”.

## *E adesso a voi!*

- 1) Analizzare il Chomp  $N \times N$ .
  - 2) Analizzare il “Gioco del 31”.
  - 3) Analizzare “Scegli e Dividi”.
- 
-

## *E adesso a voi!*

- 1) Analizzare il Chomp  $N \times N$ .
  - 2) Analizzare il “Gioco del 31”.
  - 3) Analizzare “Scegli e Dividi”.
  - 4) Giocare a Nim contro il computer.
- 
-

## *E adesso a voi!*

- 1) Analizzare il Chomp  $N \times N$ .
  - 2) Analizzare il “Gioco del 31”.
  - 3) Analizzare “Scegli e Dividi”.
  - 4) Giocare a Nim contro il computer.
  - 5) Giocare a Chomp  $4 \times 7$  contro il computer.
- 
-

## *Per saperne di più*

- E. Delucchi, G. Gaiffi, L. Pernazza, “Passatempo e giochi – alla ricerca di problemi e soluzioni”, Quaderni della settimana matematica, Università di Pisa 2007. <http://www.dm.unipi.it/~gaiffi/papers/giochi.pdf>
  - Thomas S. Ferguson, “Game theory”, [http://www.math.ucla.edu/~tom/Game\\_Theory/Contents.html](http://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theory/Contents.html)
  - E. R. Berlekamp, J. H. Conway, R. K. Guy, “Winning ways for your mathematical plays”, A. K. Peters Ltd 2001.
  - Chomp: <http://www.math.ucla.edu/~tom/Games/chomp.html>
  - Nim: <http://www.chlond.demon.co.uk/Nim.html>
- 
-