

## Einführung in die Numerik Aufgabenblatt 7

Abgabe in der Vorlesung am Donnerstag, dem 12. Juni 2008

1. (6 Punkte)

Gegeben ist das nichtlineare Gleichungssystem

$$x_1^3 + x_2^3 - 4 = 0, \quad x_1^3 - x_2^3 = 0.$$

- a) (2 Punkte) Bestimmen Sie alle reellen Lösungen des Gleichungssystems.
- b) (2 Punkte) Man zeige, dass das Newton-Verfahren zur Lösung des Gleichungssystems für jeden Startwert  $x_0 \in [1, 2] \times [1, 2] \subset \mathbb{R}^2$  konvergiert. Dabei sei  $\mathbb{R}^2$  mit der Maximumnorm  $\|\cdot\|_\infty$  ausgestattet.
- c) (2 Punkte) Ausgehend vom Startvektor  $x_0 = (1, 1)$  führe man zwei Iterationsschritte des Newton-Verfahrens durch.

2. (10 Punkte)

Die Funktion  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei definiert durch  $F(x) := x^2 - 2$ .

- a) (2 Punkte) Man zeige, dass das Newton-Verfahren für jeden Startwert  $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  konvergiert.
- b) (2 Punkte) Man zeige, dass für den Startwert  $x_0 = 1$  die Voraussetzungen des 3-Faktoren-Satzes nicht erfüllt sind.
- c) (2 Punkte) Man zeige, dass für den Startwert  $x_0 = 2$  die Voraussetzungen des 3-Faktoren-Satzes erfüllt sind. Ausgehend von diesem Startwert berechne man mit Hilfe des Newton-Verfahrens eine Näherung von  $\sqrt{2}$ , die auf 4 Stellen nach dem Komma genau ist. Dabei darf die Kenntnis des genauen Wertes nicht benutzt werden.
- d) (4 Punkte) Man führe jeweils 5 Iterationen des Sekanten-Verfahrens und der Regula falsi mit den Startwerten 1 und 2 aus. Vergleichen und erklären Sie die Ergebnisse.